



Southwest Gastroenterology Associates
 7788 Jefferson St NE, Albuquerque, NM 87109
 Phone: (505) 999-1600
 Fax: (505) 999-1650
 southwestgi.com

Miralax Split Dose Prep		
Date:	Time:	Physician:
Location: Southwest Endoscopy		
7788 Jefferson St NE, Albuquerque, NM 87109		
Please call to confirm appointment 505-999-1600		

Shopping List

1 week prior to your procedure purchase the following:

- 1 bottle of over the counter Miralax Powder, 8.3 oz. – No prescription is needed for Miralax
- 1 package of over the counter Dulcolax (Bisacodyl) Laxative 5mg tablets – No prescription is needed. (4 tablets)
- 64 oz. Gatorade or Gatorade G2 – No red or purple
- Optional for a sore bottom – plain or aloe baby wipes, Desitin, A&D ointment or Vaseline
- Clear liquids

Las siguientes instrucciones son instrucciones específicas de su médico. Por favor, siga las instrucciones cuidadosamente para asegurar una preparación exitosa.

Puede contactar a su Asesor de Pacientes con preguntas de preparación que no sean médicas al: **800.349.0285**

Puede contactar a la oficina de su médico al: **505.999.1600**

AUSENTE: A cualquier paciente que no cumpla con una cita se le cobrará una tarifa de \$ 100.00 por las citas programadas del procedimiento. La tarifa debe pagarse antes de reprogramar cualquier cita.

CANCELACIONES DE LA OFICINA: Las cancelaciones deben hacerse 24 horas antes de su cita programada. Cualquier cancelación hecha menos de 24 horas se cargara \$100.00. Para las citas del lunes, las cancelaciones deben hacerse antes del mediodía del viernes anterior. Esta cuota tendrá que ser pagada antes de reprogramar la cita.

DOSIS DE PREPARACIÓN DE MIRALAX DIVIDIDO

7 días antes del procedimiento	3 días antes del procedimiento	2 días antes del procedimiento	1 días antes del procedimiento	El día del procedimiento
<p>Notas especiales: Háganos saber si está tomando alguno de los siguientes anticoagulantes: Plavix, Coumadin, Effient, Pradaxa, Eliquis, Xarelto u otros medicamentos para el control de la sangre.</p> <p>PARE: suplementos de hierro o vitaminas que contienen hierro</p> <p>PARE: los suplementos de aceite de pescado, krill o de tiburón</p>	 <p>PARE de comer vegetales, frutas o maíz. Ningunos alimentos que contengan semillas como tomates, chile verde o bollos de semillas de sésamo. Puede comer carne, pescado, arroz, pasta, pan sin semillas, manteca de cacahuete, huevos, queso y cereal.</p> <p>Comprar artículos para la dieta de líquidos claros, pomada, material de lectura, etc.</p>	 <p>Continúa evitando vegetales, frutas o maíz. Ningunos alimentos que contengan semillas como tomates, chile verde o bollos de semillas de sésamo.</p> <p>Confirmar los arreglos con su conductor.</p>	<p>ALIMENTOS SOLIDOS NO, LIQUIDOS CLAROS SOLAMENTE al levantarse, hasta después del procedimiento. Una dieta de líquidos claros es necesaria para una colonoscopia.</p> <p>Preparación de un vistazo 12:00 pm tome 4 Dulcolax</p> <p>5:00 pm tome 32oz de la solución de preparación</p> <p>Beba mucha agua y líquidos durante el día para evitar la deshidratación.</p>	<p>8 horas antes de su procedimiento</p> <p>Comience a beber los restantes 32 oz de la solución de preparación.</p> <p>No coma ni beba 6 horas antes de su procedimiento, a excepción de su medicamento habitual con pequeños sorbos de agua 2 horas antes de su procedimiento.</p> <p>No omita los medicamentos para el corazón, la presión arterial o los ataques.</p>

*** Detalles de la dieta de líquidos claros: NO ROJO O PURPURA SIN LÁCTEOS**

Aprobado

Refrescos (soda), café, té jugos claros, las aguas de la aptitude
Caldo de Pollo, verduras y de carne
Gelatina
Paletas de helado sin pulpa

Evitar

No leche/lácteos
No jugos con pulpa
Paletas de helado con pulpa
NO **ROJO** O **PURPURA**



DOSIS DE PREPARACIÓN DE MIRALAX DIVIDIDO

Preguntas Frecuentes de Lavado Intestinal

¿Que son heces fecales claras? Heces fecales pueden tener un tinte ligero de color Amarillo o marrón. Sera completamente trasparente, y no contendrá ninguna materia sólida.

¿No estoy teniendo movimientos intestinales, que debería hacer?

Los movimientos del intestino pueden tomar hasta 5-6 horas después de comenzar la preparación para empezar. Sea paciente, siga bebiendo líquidos. Si usted no ha tenido una evacuación intestinal antes de la medianoche la noche antes de su procedimiento, tendrá que llamar al médico de turno para obtener más instrucciones.

¿La preparación me está dando nauseas, que debería hacer?

Si usted sufre náuseas o vómitos, ralentizar la velocidad a la que se bebe la solución. Por favor, intente beber toda la solución laxante, incluso si le toma más tiempo. Si el vómito persiste, o si no son capaces de terminar la preparación, detener la preparación y llamar al consultorio de su médico para obtener más instrucciones.

¿Cuáles son algunos alimentos con alto contenido de fibra que debería evitar?

Frutas y verduras crudas son generalmente altos en fibra, así como las nueces secas, semillas, panes de granos enteros y frijoles y lentejas.

¿Cuáles son algunas buenas opciones para los alimentos bajos en fibra?

Elija el pan blanco y arroz blanco para las opciones de fibra inferiores, así como pastas hechas con harina blanca. Pollo, pescado, productos lácteos y los huevos también son bajos en fibra y buenas opciones para los alimentos 2-3 días antes de comenzar su preparación.

¿Si como palomitas de maíz o semillas 3 días antes de mi procedimiento es lo que necesito para reprogramar?

Usted no tendrá que volver a programar su procedimiento, sin embargo, las semillas o nueces secas pueden causar una dificultad en la detección y requieren de una necesidad de nuevos controles. Si usted ha comido una gran cantidad de semillas o nueces secas, es posible que desee ponerse en contacto con la enfermera o el médico.

¿Puedo beber ALCOHOL en la dieta líquida?

Alcohol no está permitido como parte de la dieta líquida.

¿Puedo seguir en la dieta líquida después de comenzar el consumo de los laxantes?

Sí, es posible continuar con la dieta líquida hasta que se le indica que deje de nada por la boca, que es típicamente 4-6 horas antes del procedimiento.

¿Por qué tengo que despertar a las tan temprano para la segunda dosis, no puedo tomar todo la noche anterior? Una preparación de división ha demostrado ser el más eficaz para una colonoscopia éxito. Es esencial que siga las instrucciones que se facilitan con sus medicamentos de preparación.

¿Si peso menos de 100 libras tengo que tomar toda la preparación? La cantidad de líquido no es el peso dependiente. Es importante para terminar la preparación para una colonoscopia éxito.

DOSIS DE PREPARACIÓN DE MIRALAX DIVIDIDO

Día de preparación: El día antes del procedimiento

No alimentos sólidos al levantarse, hasta después del procedimiento. Beba mucha agua durante todo el día para evitar la deshidratación.

1

12:00 PM el día antes de su procedimiento

Vierta las 64 onzas de Gatorade en una jarra y deje enfriar en el refrigerador.



2

12:00 PM el día antes de su procedimiento

Tómese 4 (5mg) pastillas de Dulcolax con 1 vaso de agua.

*** Por favor, tenga presente que sólo necesita 4 pastillas en total.**



3

5:00 PM la noche antes de su procedimiento

Mezclar la botella entera de Miralax(8.3 oz/238g) con las **64 oz** del Gatorade refrigerado.



4

5:00 PM la noche antes de su procedimiento

Beba un vaso de 8 oz la solución cada 10-15 minutos hasta que haya terminado de beber **la mitad de la mezcla (32 oz.)**



Las respuestas individuales a los laxantes varían. Esta preparación hará que varios movimientos intestinales, permanecer cerca de un cuarto de baño.

Día de preparación: El día del procedimiento

5

8 horas antes de su procedimiento

Beba la **otra de la mezcla (32 oz)**. Beber un vaso de 8 oz de la solución cada 10-15 minutos hasta que acabe. **Debe terminar toda la preparación, incluso si sus intestinos ya están claros.**



DOSIS DE PREPARACIÓN DE MIRALAX DIVIDIDO

EL DÍA DEL PROCEDIMIENTO

Si el procedimiento es antes de las 7 AM, por favor llegue a las 6:30 AM. Nuestra oficina abre a las 6:30 AM.

- **Comience a beber la segunda dosis de la preparación 8 horas antes y luego nada durante 6 horas antes de su procedimiento**
- TOME SUS MEDICAMENTOS DE PRESION ARTERIAL, MEDICAMENTOS PARA EL CORAZON, O MEDICAMENTOS PARA LAS CONVULSIONES SIGUIENDO LAS INDICACIONES CON UN PEQUENO SORBO DE AGUA LA MANANA DE SU PROCEDIMEINTO.
- **Debe hacer arreglos para que un adulto responsable (de 18 años o más) vaya con usted a su procedimiento hasta que lo den de alta y lo lleve a su casa.** No se le permite conducir, tomar un autobús o salir de la instalación solo.
- Necesitará su tarjeta de seguro actual, identificación con foto, y el co-pago.
- Si usted es mujer, menor de 50 años, y no ha tenido una histerectomía, ooforectomía o menopausia más de 2 años, tendrá que presentar una muestra de orina para una prueba de embarazo de orina.

Si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de la preparación, por favor comuníquese con Su Asesor de Paciente al 800-349-0285 o a través del correo electrónico support@yourpatientadvisor.com.

Revised: 07/02/2021